

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 26-3-65 383788

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,  
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Pieau - TOULOUSE.

C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Supplément n° 3 au bulletin n° 54

1965 - 7

## - A V E R T I S S E M E N T S -

### ARBRES FRUITIERS

#### TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER :

Pour ces deux parasites, le nombre de périthèces arrivant à maturité devient important - et ceci en toutes régions de la Circonscription.

Il faut donc s'attendre à des projections de plus en plus nombreuses au cours des pluies à venir.

En conséquence, partout où les bourgeons ont atteint ou dépassé le stade C<sup>3</sup> (bourgeons bien éclatés) appliquer dès à présent un premier traitement.

## - I N F O R M A T I O N S -

### ARBRES FRUITIERS

#### MONILIA SUR ABRICOTIER ET SUR PECHER :

En raison du temps pluvieux et doux, les attaques de Monilia laxa sont à redouter, notamment dans les vergers où des dégâts ont été couramment observés les années précédentes. Un traitement avec un fongicide de synthèse (Type Captane, Dichlo-  
ne, Thirame) serait à appliquer dès à présent.

#### MALADIE CRIBLEE, MONILIA, GNOMONIA du CERISIER, CLOQUE DU PRUNIER :

Pour combattre ces maladies appliquer dès maintenant un produit cuprique à la dose de 250 grammes de Cuivre métal à l'hectolitre.

#### PUCERON VERT DU POMMIER :

Les éclosions d'oeufs d'hiver sont commencées. On pourrait ajouter un produit à base de Lindane à la bouillie destinée à combattre la Tavelure.

#### PSYLLE DU POIRIER - PUCERONS DIVERS :

L'élévation de la température est favorable à ces insectes. Détruire les jeunes colonies en employant un produit aphicide.

### CULTURES LEGUMIERES

#### FRAISIER : (Maladie du feuillage) :

Renouveler le traitement déjà conseillé. Ajouter un acaricide si l'on a déjà observé la présence d'Araignées jaunes.

#### P O I S :

Des attaques d'un petit charançon (Sitone) qui découpe la bordure des feuilles

.../...

#54

sont constatées.

On peut facilement détruire cet insecte par un traitement à l'aide d'un insecticide organique de synthèse (D.D.T, Parathion par exemple).

GRANDE CULTURE

MELIGETHES DU COLZA :

De nombreux méligèthes ont déjà été observés sur crucifères adventices dans les champs de colza.

Il est recommandé de surveiller les cultures.

Rappelons que le Méligèthe ne fait de dégâts sur colza que lorsque le bouton floral est très petit.

Donc dès que le colza arrive au stade bouton floral groupé et dès qu'on rencontre dans les cultures 6 à 8 insectes par plante le traitement est nécessaire.

Il devient totalement inutile à partir du moment où le colza commence à fleurir.

Les produits à utiliser sont ceux indiqués dans la note spéciale.

TOULOUSE le 23 MARS 1965

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles :

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux  
L. IMBERT